



Sondage à l'occasion de la Journée Mondiale de la Santé bucco-dentaire

Sondage Ifop pour la SFPIO

Février 2019

N° 116174

Contacts Ifop :

Fabienne Gomant / François Legrand

Département Opinion et Stratégies d'Entreprise

01 45 84 14 44

Prenom.nom@ifop.com



1 | La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour la SFPIO

Echantillon



L'enquête a été menée auprès d'un échantillon principal de **1008** personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Méthodologie



La représentativité de l'échantillon principal a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération.

Mode de recueil




Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 18 au 19 février 2019.


Note de lecture : ▲ ▼ : désignent des différences significativement supérieures / inférieures par rapport à la moyenne de l'échantillon.

2 | Les résultats de l'étude

QUESTION : Vous personnellement, êtes-vous concerné(e) par la peur de perdre ses dents ?



QUESTION : Selon vous, les situations suivantes correspondent-elles à des symptômes pouvant conduire à perdre ses dents ?




QUESTION : Vous personnellement, avez-vous déjà vécu chacune des situations suivantes ?

Total
« OUI »

Le **saignement** des gencives


78%



▲ A peur de perdre ses dents : 86%

La mauvaise **haleine** (halitose)

60%



▲ Moins de 35 ans : 68%

▲ A peur de perdre ses dents : 67%

Le **déchaussement** des dents
(ou récession des gencives)

37%



▲ 50 ans et plus : 46%

▲ A peur de perdre ses dents : 52%

88% Ont déjà vécu **au moins une** de ces situations


- Oui, de façon relativement prolongée
- Oui, le temps d'un à plusieurs jours
- Oui, mais durant un bref instant seulement
- Non, jamais

QUESTION : Et des deux opinions suivantes, laquelle se rapproche le plus de la vôtre ? Dans ce type de situation (saignement des gencives, mauvaise haleine ou déchaussement des dents)...

Il n'y a **rien à faire**, ce sont des situations qui arrivent avec l'âge, ça ne se soigne pas

10%


▲ A peur de perdre ses dents : 14%




Il existe des **solutions**,
il ne faut pas se résigner
90%

QUESTION : Et lorsque vous vous êtes trouvé(e) dans cette(ces) situation(s) (saignement des gencives, mauvaise haleine ou déchaussement des dents), en avez-vous parlé à un dentiste ?


Base : A ceux qui ont eu au moins un problème bucco-dentaire (saignement des gencives, halitose ou déchaussement des dents), soit **88%** de l'échantillon



QUESTION : D'après vous, parmi les deux propositions suivantes, quelle est la principale cause de perte des dents ?



QUESTION : Selon vous, ces types de situation dentaire (saignement des gencives, mauvaise haleine ou déchaussement des dents) constituent-ils des facteurs de risques particuliers en matière de... ?



60% Identifient **au moins un** facteur de risque

- ▲ Femme : 64%
- ▲ 35 ans et plus : 62%
- ▲ Communes rurales : 66%
- ▲ A peur de perdre ses dents : 66%

3 | Les principaux enseignements

- **La peur de perdre ses dents : un sentiment dont les symptômes sont plus ou moins bien perçus**

Plus de quatre Français sur dix sont concernés par la peur de perdre ses dents (42%), un sentiment davantage partagé par les femmes (46% vs 38% des hommes) ou les personnes appartenant aux catégories populaires (45% vs 39% des CSP+).

Concernant divers problèmes bucco-dentaires, si plus de huit répondants sur dix considèrent que le déchaussement des dents peut être un symptôme conduisant à la perte des dents (85%), le saignement des gencives n'est cité que par six répondants sur dix (60%), et seuls trois sur dix identifient la mauvaise haleine comme symptôme potentiel (31%).

Par ailleurs, entre infection et inflammation, c'est la première qui est davantage perçue par les Français comme cause possible de perte des dents : en effet, les deux tiers évoquent les caries (67%) et un tiers seulement le saignement des gencives (33%).

- **Le saignement des gencives : un problème bucco-dentaire pourtant répandu**

Près de neuf Français sur dix ont déjà fait l'expérience de l'un des trois problèmes bucco-dentaires étudiés (88%), une proportion qui augmente chez les personnes ayant peur de perdre leurs dents (95%). Dans le détail, près de huit répondants sur dix ont déjà vécu un saignement des gencives (78% et 86% chez les personnes craignant de perdre leurs dents), six sur dix une situation d'halitose (60% et 67%) et près de quatre sur dix un déchaussement des dents (37% et 52%).

- **Des problèmes bucco-dentaires quasi-unaniment perçus comme curables, mais ne conduisant pas systématiquement à consulter un dentiste**

Seul un Français sur dix considère que lorsque ces problèmes surgissent il n'y a rien à faire (10%), contre neuf sur dix qui estiment qu'il existe des solutions et qu'il ne faut pas se résigner (90%). Malgré cela, parmi les personnes ayant vécu ces problèmes bucco-dentaires, seuls 25% ont pris rendez-vous chez le dentiste spécifiquement suite à l'un de ces symptômes, 43% ont attendu l'occasion d'une visite de contrôle pour lui en parler et près d'1 personne sur 3 n'est pas allée consulter (32%).

- **Des conséquences très mal connues sur l'ensemble du corps**

Seules six personnes interrogées sur dix considèrent que ces problèmes bucco-dentaires peuvent constituer des facteurs de risques d'autres maladies, mais aucune de celles-ci n'est imaginée de façon majoritaire : ainsi arrivent en tête les accidents cardio-vasculaires (37% des répondants), le diabète (35%), la polyarthrite rhumatoïde (33%), voire les maladies pulmonaires chroniques (29%). Mais le lien avec un accouchement prématuré (17%) ou un bébé de faible poids à la naissance (15%) est rarement fait.